



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.

Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUdhËN
24 JANAR – 30 JANAR 2011
(JAVA 04)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 34 rrethe ose 94% (=34/36) e tyre

16 rrethe ose 44% (=16/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LEZHË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

18 rrethe ose 50% (=18/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KOLONJË, KRUIË, KUKËS, KURBIN, LIBRAZHD, M. MADHE MIRDITË, PEQIN, TEPELENË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 2 rrethe ose 6% (=2/36) e tyre:

MALLAKASTËR, PUKË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 4-t


	JAVA 04
DIARRE PA GJAK	790
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	10.043
INF. RESP. TE POSHTEME	5.842
RASH ME TEMPERATURE	19
VERDHEZA	1
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	361
% e Njësive Raportuese	86%(361/420)

Rash me temperaturë


11 raste janë raportuar nga rrethi i Tiranës, 5 raste nga rrethi i Pogradecit dhe 2 raste rrethi i Fierit. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekët infeksionistë dhe epidemiologë të rrethëve përkatës, rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet 4% rritje në javën e 4-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 3-të.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave



Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet rënie në javën e 4-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 3-të.


Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 40 – 04 të sezonit 2009 - 2010 dhe të sezonit 2010 - 2011. Numri i rasteve.




Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën e 3-të dhe javën e 4-të të vitit 2011. Incidenca (raste/10.000)




Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 40 – 04 të sezonit 2009 - 2010 dhe të sezonit 2010 - 2011. Numri i rasteve.



Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën e 3-të dhe javën e 4-të të vitit 2011. Incidenca (raste/10.000)



Nivelet e Raportimit për javën e 4^t sipas rretheve, në përqindje.




Sëmundje e Rëndë Respiratore Akute (SRRA)

Në sistemin e Survejancës së Dedikuar Spitalore përfshihen edhe 2 sindromat e mëposhtëme:


- Insuficiencë Respiratore Akute (IRA)/ Sëmundje e Rëndë Respiratore Akute (SRRA)
- Sëmundje e rëndë e pashpjeguar dhe vdekje e papritur.

Pesha specifike e SRRA ndaj numrit të rasteve që është marrë mostër



Nga data 1 Dhjetor 2010 deri në datën 4 Shkurt 2011 janë marrë gjithsej 412 mostra nga persona të dyshuar me Grip, prej të cilëve 29(7%) raste kanë paraqitur komplikacione (SRRA). 4 raste ose 14% e tyre janë raportuar gjatë muajit dhjetor 2010 dhe 25 prej rasteve me SRRA ose 86% e tyre janë raportuar gjatë muajit janar 2011.

Vendi i marrjes se mostrave dhe rezultati laboratorik




9 prej mostrave ose 31% e tyre janë konfirmuar me viruset e Gripit.

2(7%) mostra janë konfirmuar me virusin B

7(24%) prej tyre me virusin A të gripit - [5(17%) mostra A/H1N1 dhe 2(7%) A/H3].

Vërehet rritje e numrit të rasteve me SRRA në javën e 4^t të muajit janar 2011.

Shpërndarja e rasteve SRRA sipas grupmoshës



Pacientët me grip prej virusit A i përkasin pothuajse të gjithë grupmoshave:

- 1-4 vj vërehet 1 rast ose 50% e totalit kesaj grupmoshe;
- 5-14 vj vërehet 1 rast ose 33% e totalit te grupmoshes ;
- 25-44 vj vërehet 1 rast ose 33% e totalit te grupmoshes ;
- 45-59 vj, vërehet 1 rast ose 33% e totalit te grupmoshes ;
- 45-59 vj, vërehet 1 rast ose 33% e totalit te grupmoshes ;
- 60+ vj, vërehen 3 raste ose 60% e totalit te grupmoshes ;

Rastet me virusin B i përkasin grupmoshave 15-24vj dhe 25-44vj me përkatësisht nga 1 rast ose (3%) të totalit secila grupmoshë, ose 14% e rasteve të grupmoshës 15-24vj dhe 33% e rasteve të grupmoshës 25-44vj.

.....
.....