



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.

Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUdhËN
31 JANAR – 6 SHKURT 2011
(JAVA 05)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 34 rrethe ose 94% (=34/36) e tyre

16 rrethe ose 44% (=16/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LEZHË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

18 rrethe ose 50% (=18/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KOLONJË, KRUIË, KUKËS, KURBIN, LIBRAZH, MIRDITË, MALLAKASTËR, PEQIN, TEPELENË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 2 rrethe ose 6% (=2/36) e tyre:

M. MADHE, PUKË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 5-të


	JAVA 05
DIARRE PA GJAK	727
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	10.133
INF. RESP. TE POSHTEME	6.099
RASH ME TEMPERATURE	4
VERDHEZA	1
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	361
% e Njësive Raportuese	86%(361/420)

Rash me temperaturë


Rastet janë raportuar nga rrethi i Fierit. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rrethit përkatës, rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet i qëndrueshëm në javën e 5-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 4-t.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave



Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet rënie në javën e 5-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 4-t.


Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 40 – 05 të sezonit 2009 - 2010 dhe të sezonit 2010 - 2011. Numri i rasteve.



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën e 4-të dhe javën e 5-të të vitit 2011. Incidenca (raste/10.000)




Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




**Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 40 – 05 të sezonit 2009 - 2010 dhe të sezonit 2010 - 2011.
Numri i rasteve.**



Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën e 4-të dhe javën e 5-të të vitit 2011. Incidenca (raste/10.000)



Nivelet e Raportimit për javën e 5^{të} sipas rretheve, në përqindje.




Sëmundje e Rëndë Respiratore Akute (SRRA)

Në sistemin e Survejancës së Dedikuar Spitalore përfshihen edhe 2 sindromat e mëposhtëme:

- Insuficiencë Respiratore Akute (IRA)/ Sëmundje e Rëndë Respiratore Akute (SRRA)


- Sëmundje e rëndë e pashpjeguar dhe vdekje e papritur.

Pesha specifike e SRRA ndaj numrit të rasteve që është marrë mostër



Nga data 1 Dhjetor 2010 deri në datën 11 Shkurt 2011 janë marrë gjithsej 505 mostra nga persona të dyshuar me Grip, prej të cilëve 36(7%) raste kanë paraqitur komplikacione (SRRA). 4 raste ose 11% e tyre janë raportuar gjatë muajit dhjetor 2010, 23 prej rasteve me SRRA ose 64% e tyre janë raportuar gjatë muajit janar dhe 9 raste ose 25% e tyre gjatë muajit shkurt 2011

Vendi i marrjes se mostrave dhe rezultati laboratorik




12 prej mostrave ose 33% e tyre janë konfirmuar me viruset e Gripit.

2(6%) mostra janë konfirmuar me virusin B

10(28%) prej tyre me virusin A të gripit [8(22%) mostra A/H1N1 dhe 2(6%) A/H3].

Shpërndarja e rasteve SRRA sipas grupmoshës



Pacientët me Grip prej virusit A i përkasin pothuajse të gjithë grupmoshave:

- 1-4 vj vërehet 1 rast ose 33% e totalit kësaj grupmoshe;
- 5-14 vj vërehet 1 rast ose 33% e totalit të grupmoshës ;
- 25-44 vj vërehen 2 raste ose 50% e totalit të grupmoshës ;
- 45-59 vj, vërehen 2 raste ose 40% e totalit të grupmoshës ;
- 60+ vj, vërehen 4 raste ose 57% e totalit të grupmoshës ;

Rastet me Grip prej virusit B i përkasin grupmoshës 15-24vj me 1 rast ose 14% e rasteve të kësaj grupmoshe dhe grupmoshës 25-44vj me 1 rast ose 25% e rasteve të kësaj grupmoshe.

.....
.....