



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 20 13 – 19 Maj 2024

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 NJVKSH ose 100% (=36/36) e tyre

36 NJVKSH ose 100% (=34/36) e tyre kanë raportuar në platformën dixhitale SISI:

BERAT, BULQIZË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIJË, KUÇOVË, KUKËS, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJE, MALLAKASTËR, M. MADHE, MAT, MIRDITË, PEQIN, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 0 NJVKSH ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 20

	JAVA 20
DIARRE PA GJAK	1.359
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	7.749
INF. RESP. TE POSHTËME	3.288
RASH ME TEMPERATURË	28
VERDHEZA	0
ETHE E ZGJATUR E PASHPJEGUAR (> 3 JAVE)	0
ANOMALI KONGENITALE	0
KONJUKTIVIT AKUT TEK NEONATËT	0
Numri i Njësive Raportuese	424
% e Njësive Raportuese	96% (424/442)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë dhe dorë-këmbë-gojë:

Durrës – 1 rast

Fier – 3 raste

Lushnje – 2 raste

Mat -1 rast


Pogradec – 1 rast

Tiranë – 17 raste


Vlorë – 3 raste

Infeksione respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet ritje në javën 20 krahasuar me javën paraardhëse, java 19.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqitet e qëndrueshme në javën 20 krahasuar me javën paraardhëse, java 19.

Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 10 – 20 të viteve 2023 dhe 2024. Numri i rasteve.




Në javën 20 të vitit 2024 vërehet prirje e qëndrueshme e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 19 dhe 20 / 2024. Incidenca (raste/10.000)




**Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët në javët 10 - 20 të viteve 2023 dhe 2024.
Numri i rasteve.**



Në javën 20 të vitit 2024 vërehet e prirje e qëndrueshme e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”.

**Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 19 dhe 20 / 2024.
Incidenca (raste/10.000)**



Nga komunikimi me NJVKSH shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Ngjarje kombëtare

1. Fruthi, situatë epidemiologjike (Shtojca 2)

- Për periudhën Janar – 20 maj 2024 janë testuar 182 raste të dyshuar me fruth nga të cilët janë konfirmuar 39 (21.4%) raste me Fruth.
- Nga keto 36 raste janë konfirmuar në laboratorin kombëtar të referencës të virologjisë në ISHP dhe 3 raste janë konfirmuar sipas perkufizimit të rastit mbeshtetur në shenjat klinike dhe epidemiologjike.
- Incidenca e sëmundjes në vend është 1.4 raste/100 000 banorë.
- Rastet i perkasin moshes nga 0-38 vjec (mediana 5 vjec).
- Numri më i lartë i perkët grupmoshes 5-9 vjec me 30.8% të totalit të rasteve të konfirmuar
- Incidenca më e lartë është në grupmoshën 2-4 vjec me 14 raste/100 000 banorë.
- Nga 39 rastet e konfirmuar 22 (56.4%) prej tyre janë shtruar në spital dhe 17 raste (43.6%) kanë qëndruar në kushte shtëpie.
- Nga 39 rastet, 22 raste janë të pavaksinuar (56.4%) dhe 17 raste (43.6%) janë të vaksinuar me të paktën një dozë vaksine.
- Numri më i lartë i rasteve i perkët Tiranës me 26 raste ose 66.7% e totalit.
- Incidencën më të lartë e ka Durrësi me 4.7 raste/100 000 banorë.

Ngjarje ndërkombëtare

2. Sëmundja invazive meningokoksike e importuar në udhëtarët që kthehen nga Mbretëria e Arabisë Saudite – 2024

- Më 23 prill 2024, Franca raportoi tre raste të sëmundjes invazive meningokokale (IMD) të lidhura me histori udhëtimi në Mbretërinë e Arabisë Saudite (KSA); një rast tjetër u njoftua më 17 maj 2024.
- Që nga 17 maj 2024, 12 raste të IMD janë raportuar nga Franca (4), Mbretëria e Bashkuar (MB) (3) dhe Shtetet e Bashkuara (SHBA) (5).
- Sekuenca të tëra gjenomi nga ngjarja tregojnë se një sekuençë nga Franca, katër nga MB dhe një nga SHBA, të marra nga mostrat e mbledhura në vitin 2024, formojnë një nën-grup shumë të ngushtë, që tregon një lidhje epidemiologjike.
- Përhapja ndërkombëtare e IMD-së lidhur me tubimet masive gjatë pelegrinazheve në AS është raportuar në të kaluarën.
- Vaksinimi kundër meningokokut rekomandohet për ata që udhëtojnë për në AS për të kryer Umren dhe për haxhinjtë e Haxhit.

3. Fruthi – Shumë vende (Botë) – Monitorimi i shpërthimeve evropiane

- Në mars 2024, 29 vende raportuan të dhëna për fruthin në Sistemin Evropian të Survejancës (TESSy), me 695 raste të raportuara nga 23 vende. Ishin gjashtë vende që raportuan zero raste.

- NËPËRMJET aktiviteve të tij të inteligjencës epidemike, ECDC ka identifikuar 3 826 raste të reja të fruthit në 16 vende të BE/EEA që nga përditësimi i fundit mujor, duke përfshirë raporte mbi shpërthimet e vazhdueshme ndër të tjera në Austri, Irlandë, Francë, Holandë dhe Rumani.
- Gjashtëmbëdhjetë vdekje të lidhura me fruthin janë raportuar, në Rumani (15) dhe Irlandë (1).
- Në përgjithësi, transmetimi i fruthit në BE/ZEE ka qenë në rritje gjatë 12 muajve të fundit, megjithëse situata ndryshon sipas vendit, me disa vende që raportojnë shpërthime të mëdha dhe të tjera nuk kanë ose kanë transmetim shumë të ulët.

4. Kolera - Raporti i OBSH-së (shtojca 3)

- Në prill 2024 (javët epidemiologjike 14 deri më 17), gjithsej 27 696 raste të reja kolere u raportuan nga 19 vende, territore dhe zona (në vijim vendet) në katër rajone të OBSH-së, duke mos treguar ndryshime të rëndësishme (1% rritje) nga muaji i kaluar.
- Rajoni i Mesdheut Lindor regjistroi numrin më të madh të rasteve, i ndjekur nga Rajoni Afrikan, Rajoni i Evropës dhe Rajoni i Azisë Juglindore.
- U regjistruan 281 vdekje të lidhura me kolerën globalisht, duke theksuar një rritje prej 31% nga muaji i kaluar. Rreth të njëjtës periudhë të vitit të kaluar, u raportuan 40 856 raste dhe 247 vdekje të lidhura me kolerën nga 22 vende.
- Rastet dhe vdekjet e raportuara gjatë kësaj periudhe në vitin 2024 janë përkatësisht 32% më të ulëta dhe 14% më të larta se ato të raportuara në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
- Më 26 prill 2024, departamenti i jashtëm francez i Mayotte në Oqeanin Indian konfirmoi një shpërthim të ri kolere, duke përfshirë disa individë që mbërritën në Mayotte nëpërmjet varkave nga vendet fqinje të Komoreve të prekura nga kolera dhe Republika e Bashkuar e Tanzanisë. Janë raportuar gjithsej 26 raste të fituara në vend.
- Nga 1 janari 2024 deri më 28 prill 2024, një total kumulativ prej 145 900 rastesh kolere dhe 1766 vdekje u raportuan nga 24 vende në pesë rajone të OBSH-së, me Rajonin Afrikan që regjistron shifrat më të larta, i ndjekur nga Rajoni i Mesdheut Lindor, Rajoni i Amerikat, Rajoni i Azisë Juglindore dhe Rajoni i Evropës. Nuk u raportua asnjë shpërthim në Rajonin e Paqësorit Perëndimor gjatë kësaj kohe.
- Reagimi ndaj kolerës vazhdon të ndikohet nga një mungesë kritike e Vaksinave Orale të Kolerës (OCV). Që nga janari 2023, kërkesat për OCV janë rritur, me 82 milionë doza të kërkuara nga 15 vende, gati dyfishi i 46 milionë dozave të prodhuara gjatë kësaj periudhe. Stoku global i vaksinave ishte varfëruar deri në fillim të marsit.
- Që nga 6 maj 2024, stoku ka 3.2 milionë doza, që është nën objektivin e stokut global prej pesë milionë dozash.
- OBSH e klasifikoi rishfaqjen globale të kolerës si një emergjencë të shkallës 3 në janar 2023, niveli i saj më i lartë i brendshëm për emergjencat.
- Bazuar në numrin e shpërthimeve dhe zgjerimin e tyre gjeografik, krahas mungesës së vaksinave dhe burimeve të tjera, OBSH e rivlerësoi rrezikun në nivel global si shumë të lartë dhe ngjarja mbetet e klasifikuar si një emergjencë e shkallës 3.
- OBSH vazhdon të punojë me partnerët globalë, rajonalë dhe të vendit për të mbështetur Shtetet Anëtare në përgjigje.

- Dinamika e shpërthimeve të kolerës është gjithnjë e më komplekse për shkak të faktorëve që tejkalojnë kufijtë kombëtarë, si lëvizshmëria e popullsisë, fatkeqësitë natyrore dhe ndryshimet klimatike.
- Mbikëqyrja joadekuate e sëmundjeve në zonat kufitare dhe ndërgjegjësimi i kufizuar në komunitetet e prekura nga kolera janë gjithashtu faktorë kontribues. Për të adresuar këto sfida, vendet duhet t'i japin përparësi bashkëpunimit ndërkufitar duke krijuar mekanizma të shkëmbimit të të dhënave në kohë reale, duke harmonizuar sistemet e mbikëqyrjes, duke bashkuar burimet dhe duke zbatuar ndërhyrje të përbashkëta gatishmërie dhe reagimi.